

## 胃内視鏡検査（胃カメラ）のご案内

検査予約日時: 令和 年 月 日 ( 曜日) 午前・午後 時 分

この用紙を持参して20分前にお越しください

貴金属、義歯、マニキュアは検査前外していただきますのでご了承ください

※絶食により低血糖になりますので糖尿病のお薬は飲まないでください

1.経鼻内視鏡を用いて食道、胃、十二指腸を観察します。

2.オンライン予約の方は検査前に診察があります。検査前か検査後に血液検査がございます。  
当院で直接ご予約いただいた方は検査をスムーズに始めさせていただきます。

3.検査を午前に受けられる方

- 検査前日の夕食まで普通にとってください。
- 検査前日:夜9時以降は飲食しないでください。
- 検査当日:絶飲食（お水コップ1杯程度は構いません）

検査を午後に受けられる方

- 検査前日:特に制限はありません。飲酒は控えてください。
  - 検査当日:朝食は8時までに済ませて下さい。昼食は食べないでください。
- ★水とお茶は検査の2時間前まで可能です。

※降圧剤、心臓のお薬は中断せずに服用して来てください。

4.持参していただくものは

- ご案内、問診票、同意書（ホームページから印刷していただきご持参いただくとスムーズです）
- お持ちの方は診察券、保険証、お薬手帳

5.当院では経鼻内視鏡（鼻からの胃カメラ）を採用しておりますので医師と会話しながら検査をすることができます。検査終了後に所見を説明します。  
生検の結果は約1週間後になります。

6.内視鏡機器の洗浄、消毒には消化器内視鏡学会ガイドラインに遵守し細心の注意を払っておりますので  
ご安心ください。

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）問診票

記入日 令和 年 月 日

フリガナ

氏名 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 男・女

今までに胃カメラを受けたことがありますか？	はい・いいえ
検査を受けたことがある方はピロリ菌の除菌や生検をされましたか？ ☆はいの方（いつ頃・検査結果）	はい・いいえ
ピロリ菌の検査を希望されますか？	はい・いいえ
大きな手術をしたことがありますか？	はい・いいえ
アレルギーはありますか？ ☆はいの方→歯科の麻酔薬・アルコール・その他（）	はい・いいえ
心臓の病気はありますか？ 心筋梗塞・狭心症・不正脈・ペースメーカー その他（）	はい・いいえ
血をさらさらにするお薬を飲んでいますか？ ☆はいの方→お薬の名前（）	はい・いいえ
下記の病気はありますか？ ☆はいの方→緑内障・糖尿病・前立腺肥大症・重症筋無力症・喘息 HIV 感染・C 型肝炎・甲状腺機能亢進症・体内金属（部位）	はい・いいえ
乳房手術や透析などで注射や血圧測定できない腕がありますか？ ☆はいの方→右腕・左腕	はい・いいえ
妊娠中ですか？妊娠している可能性はありますか？授乳中ですか？	はい・いいえ
鎮静剤（眠たくなる薬）を希望しますか？	はい・いいえ
外せる歯はありますか？	はい・いいえ
連絡のつくご家族を教えてください 氏名: _____ 族柄: _____ 連絡先 _____	

ご記入ありがとうございました。

とさ内科クリニック

## 上部消化管内視鏡検査説明・同意書

### 1. 医療内容

- この検査はあなたの消化管の中を直接内視鏡にて観察し、細心の注意を払いながら診断を行う方法です。
- 観察部位は食道・胃・十二指腸です。検査時間は 10 分～15 分です。

### 2. 説明

I のどや鼻の麻酔をします。

II ご希望に応じ鎮静剤を使用しうとうとした状態で内視鏡を挿入します。

① その場合検査しながら説明を受けることはできません。

② 鎮静剤をご希望される方は検査当日は車、バイク、自転車の運転は出来ません。

公共の交通機関でご来院ください。 検査後リカバリー室で最低 30 分間休んでいただきます。

III 検査中に何かの病変が見られたり、また疑われた場合にはより正確な診断のため必要に応じて以下のようなことが行われます。

① 組織の一部を鉗子でつまみ（生検）組織の検査を行います。

まれに組織検査で診断の必要上から特殊検査を行い、後日特殊検査の費用を請求することがあります。

（お持ちの病気や、内服されている薬によっては生検できない場合がございます）

② 変部位に安全な色素を散布し病変を明瞭にして診断の助けとします。

（あとで着色された便が出ることがございます）

IV 出血が見られた場合には必要に応じて止血操作（内視鏡的止血術）を行います。

V 内視鏡検査による危険性としては以下のようなことが報告されております。

① スコープ（カメラ）による粘膜障害（粘膜亀裂）や裂傷

② 生検による出血

③ 前処置による副作用（頻脈、尿閉、局所麻酔薬アレルギーによるショックなど）

④ 唾液の誤嚥による肺炎

⑤ 鎮静剤による呼吸抑制症状（呼吸が弱くなる）

⑥ 偶発性の頻度は通常の内視鏡検査で300人に1人、死亡率は13万人に1人

ただし、以上の危険性には細心の注意を払いながら内視鏡検査は行われます。

万一、緊急事態が生じた場合には、当院医師が責任を持って対処いたします。

とさ内科クリニック 院長 土佐紀夫

私は上記内容の説明を受け理解しましたので上部消化管内視鏡検査を受けることに同意します

令和 年 月 日

同意者氏名（自署） \_\_\_\_\_

親族または代理人 \_\_\_\_\_

未成年の場合は保護者の署名をお願いします。

保護者（患者様との俗柄） \_\_\_\_\_